

การณสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กองการศึกษา ที่ สก ๐๐๒๓.๖/ว ๗๗๗

- กองยุทธศัตรู
- กองสวัสดิการฯ
- ตรวจสอบภายใน
- สถานอนามัยฯ
- สถานีน้ำประปา

เรื่อง รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และนายกเทศมนตรีเมือง ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๑๕๐๑

ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดสระแก้วได้รับแจ้งจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ในประเทศไทย ยังคงพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ ราย และ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ ราย และยังพบผลbaughส์ต์ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ที่มีการระบาดต่อน่อง ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ ที่ก่อให้เกิดผู้เสียชีวิตปรากฏว่า เมื่อถูกสุนัขหรือแมว กัด ข่วน และไม่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า นอกจากนี้ ยังพบอีกว่าร้อยละ ๕๐ ของผู้เสียชีวิตถูกสุนัขของตนเองกัด ข่วน ทั้งนี้ ไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีน ตามหลักเวชศาสตร์ จึงทำให้ผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเสียชีวิตในที่สุด เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดสระแก้วจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประชาสัมพันธ์ ดังนี้

๑) สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบว่า โรคพิษสุนัขบ้ามีอันตรายถึงชีวิตผู้ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า จะเสียชีวิตเกือบทุกราย และสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากปัจจัยบันยังไม่มียาที่ใช้ในการรักษา แต่ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน โดยสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลใกล้บ้าน

๒) การปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากถูกสุนัขหรือแมว กัด ข่วน ให้ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดทันที เช็ดแผลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และรีบไปพบแพทย์ทันทีพร้อมประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเข้ารับการรักษาที่ถูกต้อง

๓) หากพบว่าสุนัขหรือแมว กัด ข่วน ตนเองหรือผู้อื่น ให้นำสุนัขหรือแมวไปชั่งไว้ เพื่อสังเกตอาการอย่างน้อย ๑๐ วัน หรือพบสัตว์สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดทันที

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(.....)

(นายเข่วนเตอร์ ยิ่มประเสริฐ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานบริการสาธารณสุขท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

โทร ๐ ๓๗๔๒ ๕๑๑๙ ต่อ ๑๓

โทรสาร ๐ ๓๗๔๒ ๕๑๑๙

กองสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ

เลขที่ ๑๐๔

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๑๑.๔๙

กทม.



สำนักปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว

เลขที่ ๒๘๖๖

วันที่รับ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เวลา ๑๑.๑๐

ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ผู้รับ (.....)



ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
เลขที่ ๕๙๗
วันที่ ๐๑ เม.ย. ๒๕๖๖

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น บ.
ถนนนราธิวาส แขวงศูนย์ ถนน ๑๐๘๐๐

วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สำเนาหนังสือรับรองการปักครื่องท้องถิ่นนี้
เลขที่ ๒๙๙๙
วันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๖๖
เวลา ๑๓.๐๐ ชั่วโมง

เรื่อง รายงานค่าประชาสัมพันธ์การปักกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สื่อประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ด้วยสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ยังคงพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ ราย และ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ ราย และยังพบผลบวกสัตว์ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดให้เกิดผู้เสียชีวิตปรากฏว่า มีอยู่สุนัข หรือแมว กัด ชews และไม่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า นอกจากนี้ ยังพบอีกว่าร้อยละ ๕๐ ของผู้เสียชีวิตสุนัขของคนเองกัด ชews หัวนี้ ไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนตามหลักเวชศาสตร์ จึงทำให้ผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเสียชีวิตในที่สุด

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ดังนี้

๑. สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบว่า โรคพิษสุนัขบ้ามีอันตรายถึงชีวิต ผู้ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะเสียชีวิตเกือบทุกราย และสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากในปัจจุบัน ยังไม่มียาที่ใช้ในการรักษา แต่ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน โดยสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน

๒. การบูรณาการเบื้องต้นหากสุนัขหรือแมว กัด ชews ให้ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดทันทีที่เหตุผลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและรับไปพบแพทย์ทันทีพร้อมประวัติการ ได้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเข้ารับการรักษาที่ถูกต้อง

๓. หากพบว่าสุนัขหรือแมว กัด ชews คนอาจหรือผู้อื่น ให้นำสุนัขหรือแมวไปชั่งไว้ เพื่อสังเกตอาการอย่างน้อย ๑๐ วัน หรือพบสัตว์ส่งสัญญาเป็นโรคพิษสุนัขบ้าต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดทันที

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์ <https://bit.ly/3JySTuo> หรือ QR-Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นาย สมชาย ใจดี

ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตฯ

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กองสารานุรักษ์ท้องถิ่น
กลุ่มงานป้องกันโรค
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗๓๐๐๐ ต่อ ๕๕๐๗
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
ผู้ประสานงาน นางสาวรัตนาภรณ์ สองแก้ว

โรคพิษสุนัขบ้า



กลุ่มเสี่ยง



อายุต่ำกว่า ๑๕ ปี



ถูกกัด ข่วน

แล้วไม่ได้ฉีดวัคซีน

การติดต่อ
ถูกสัตว์มีเขี้ยว



อาการผู้ป่วย



ดูอย่างไรว่าสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า

ระยะแรก

- น้ำลายเปลี่ยน ไปร่าเริง
- หงุดหงิด เก็บตัว
- หวาดระวetypes; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">忙忙

ระยะตื้นเดิน

- กระวนกร้าย
- กัดไม่เลือก
- เห่าหนอน

ระยะอัมพาต

- น้ำลายไหล
- ขาห้อยตก
- ล้มลง ตาย

อย่า
ด้วย



กันสุนัขกัด

ทำให้สุนัขโกรธ

อย่าเหียบ



หาง หัว ตัว ขา
ให้สุนัขตกใจ

อย่าแยก



สุนัขที่กัดกันด้วยมือ

เปล่า

อย่าหยิบ



อาหารที่สุนัขกำลังกิน

อย่าสูง



กับสุนัขที่ไม่รู้จัก
หรือไม่มีเจ้าของ


เกิดจากเชื้อ เรบีสไวรัส (RABIES VIRUS) มีสัตว์เสี่ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว วัว ควาย ลิง หมู หนู กระต่าย กระรอก ฯลฯ เป็นพาหะนำโรค ผู้ติดเชื้อจะมีอาการ ตาย ๑๐๐%

คำแนะนำเมื่อถูกกัด - ข่วน-เลีย




ล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาด

หลาย ๆ ครั้ง



กักหมา - แมว

เพื่อสังเกตอาการ ๑๐ วัน



ใสยา เบตาดีน



หากมีอาการฉีดวัคซีนต้อง^{มาตามนัดทุกครั้ง}

คำแนะนำสำหรับผู้เลี้ยง



ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี



ออกนอกร้านต้องใส่สายจูง



ฝึกให้ เชือฟังคำสั่ง



ทำหมัน คุมกำเนิด

โรคพิษสุนัขบ้า

อันตราย! แต่ป้องกันได้



โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) หรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดเชื้อในระบบประสาท จากสัตว์สู่คน เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้พบแค่สุนัขเท่านั้น แต่พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด เช่น สุนัข แมว วัว ลิง หนู กระต่าย เป็นต้น

ผู้ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะเสียชีวิตเกือบทุกราย เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มียารักษา แต่ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน



อาการหลังจากติดเชื้อพิษสุนัขบ้า

ระยะที่ ๑

มีไข้ เปื่อยอาหาร



ระยะที่ ๒

มีอาการที่ทางประสาท
คลัมคลั่ง



ระยะที่ ๓

ภาวะหายใจลำเหลา
หัวใจหยุดเต้น โครมา
และเสียชีวิต



๓ ขั้นตอนการป้องกันการติดเชื้อ

พาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า



หลีกเลี่ยงไม่ให้
สูกสัตว์กัด ทำร้าย



หลังโดนกัด
รีบไปพบแพทย์ทันที
เพื่อฉีดวัคซีนป้องกัน



กองสารานุสุขก้องถั่น



กองสารานุสุขก้องถั่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น