



☐ สำนักปลัด

☐ กองคลัง

☐ กองช่าง

☒ กองสาธารณสุข

☐ กองการศึกษา

☐ กองยุทธศาสตร์

☐ กองสวัสดิการ

☐ ตรวจสอน

☐ สถานพยาบาล

☐ สถานีขนส่ง

ที่ สก ๐๐๒๓.๖/ว ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือเร่งรัดความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ (วัคซีน OPV และ IPV) ในกลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับ นายอำเภอวังน้ำเย็น นายอำเภอเขาฉกรรจ์ นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว และนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๒๑.๕/ว ๒๕๖๗

ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า สถานการณ์การระบาดของโรคโปลิโอทั่วโลกในช่วง

๕ ปีที่ผ่านมา ยังคงพบการระบาดของโรคโปลิโอสายพันธุ์ก่อโรคตามธรรมชาติ (Wide Poliovirus: WPV) สายพันธุ์ที่ ๑ และพบผู้ป่วยโรคโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ (Vaccine - derived Poliovirus: VDPV) ที่มีแนวโน้มการระบาดที่เพิ่มขึ้นในหลายประเทศจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก ในปี ๒๕๖๗ พบการระบาดของโรคโปลิโอสายพันธุ์ก่อโรคตามธรรมชาติ (WPV) จำนวน ๙๙ ราย ใน ๒ ประเทศ คือ ประเทศอัฟกานิสถาน และปากีสถาน แม้ว่าประเทศไทยไม่มีการรายงานพบผู้ป่วยโปลิโอ แต่ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของโรคโปลิโอเข้ามาในประเทศไทยได้ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีระดับความครอบคลุมต่ำ และพื้นที่ติดกับพื้นที่การระบาดของโรค ประกอบกับภาพรวมระดับความครอบคลุมการรับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า ๑ ปี ทั้งวัคซีน OPV และวัคซีน IPV มีแนวโน้มลดลงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ และหลายจังหวัดมีระดับความครอบคลุมต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเป็นการเพิ่มระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอให้สูงขึ้น และเด็กกลุ่มเป้าหมายได้รับภูมิคุ้มกันเพียงพอต่อการป้องกันโรค พร้อมทั้งป้องกันการเกิดการระบาดของโรคโปลิโอในประเทศอีกครั้ง

จังหวัดสระแก้ว จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งสถานพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) หรือหน่วยบริการฉีดวัคซีนในสังกัดทราบ เพื่อเร่งรัดความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ (วัคซีน OPV และ IPV) ในกลุ่มเป้าหมาย ดังต่อไปนี้

๑. ขอให้ติดตามหน่วยบริการในพื้นที่ ดำเนินการติดตามเร่งรัดเพิ่มความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ (วัคซีน OPV และ IPV) ในกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ทุกพื้นที่ (ตำบล/อำเภอ/จังหวัด) และพื้นที่ที่มีระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนต่ำ ขอให้ดำเนินการค้นหาเด็กที่ไม่เคยได้รับวัคซีน (Zero dose) พร้อมติดตามมารับวัคซีน

๒. ขอให้เจ้าหน้าที่สถานบริการตรวจสอบข้อมูลการรับวัคซีน และประสานติดตามเด็กกลุ่มเป้าหมายที่พลาดการรับวัคซีน เด็กที่ได้รับวัคซีนช้า หรือไม่เคยได้รับวัคซีนให้มารับวัคซีนโดยเร็ว

๓. เน้นย้ำ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักถึงประโยชน์ และความสำคัญการรับวัคซีนแก่ผู้ปกครองในการพาบุตรหลานมารับวัคซีนให้ตรงตามกำหนด สามารถดาวน์โหลดสื่อความรู้ ได้ที่เว็บไซต์กองโรคติดต่อทั่วไป ทางลิงก์ <https://ddc.moph.go.th/dcd/>


สำนักปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว
เลขที่ ๔๙๓๔
วันที่รับ 30 มิ.ย. 2568
เวลา 15.16
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
ถนนสุวรรณศร สก ๒๗๐๐๐

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 1731
วันที่ 30 มิ.ย. 2568
เวลา 15.16
ลงชื่อผู้รับ
จำนวน ๑ ชุด

๔. กำกับ ติดตาม และเร่งรัดหน่วยบริการสาธารณสุข ดำเนินการบันทึกข้อมูลการรับบริการ
วัคซีนของเด็กกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ในฐานระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ Health Data Center
(HDC) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันตามช่วงเวลาที่กำหนด
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอบอกขอให้แจ้งองค์การบริหาร
ส่วนตำบลคลองหินปูนและองค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิงทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายชวนเนตร ยิ้มประเสริฐ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว



ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
เลขรับที่ ๙๓๘๓
วันที่ 25 มิ.ย. 2568
เวลา.....น.



ที่ มท ๐๘๒๑.๕/ว๒๓๐๗

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว
เลขรับที่ 5861
วันที่ 25 มิ.ย. 2568
เวลา.....น.

เรื่อง ขอความร่วมมือเร่งรัดความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอในกลุ่มเป้าหมาย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๔๑๐.๘/๒๐๙๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘

กลุ่มงานบริหารการสาธารณสุข
และประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
รับที่ 961
วันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๘
จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุขว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโปลิโอทั่วโลกในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ยังคงพบการระบาดของโรคโปลิโอสายพันธุ์ก่อโรคตามธรรมชาติ (Wide Poliovirus: WPV) สายพันธุ์ที่ ๑ และพบผู้ป่วยโรคโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ (Vaccine-derived Poliovirus: VDPV) ที่มีแนวโน้มการระบาดที่เพิ่มขึ้นในหลายประเทศจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก ในปี ๒๕๖๗ พบการระบาดของโรคโปลิโอสายพันธุ์ก่อโรคตามธรรมชาติ (WPV) จำนวน ๙๙ ราย ใน ๒ ประเทศ คือ ประเทศอัฟกานิสถาน และปากีสถาน แม้ว่าประเทศไทยไม่มีการรายงานพบผู้ป่วยโปลิโอ แต่ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของโรคโปลิโอเข้ามาในประเทศไทยได้ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีระดับความครอบคลุมต่ำ และพื้นที่ติดกับพื้นที่การระบาดของโรค ประกอบกับภาพรวมระดับความครอบคลุมการรับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า ๑ ปี ทั้งวัคซีน OPV และวัคซีน IPV มีแนวโน้มลดลงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ และหลายจังหวัดมีระดับความครอบคลุมต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเป็นการเพิ่มระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอให้สูงขึ้น และเด็กกลุ่มเป้าหมายได้รับภูมิคุ้มกันเพียงพอต่อการป้องกันโรค พร้อมทั้งป้องกันการเกิดการระบาดของโรคโปลิโอในประเทศอีกครั้ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แจ้งสถานพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรชนามีนทราชนิธิ์ (สอน.) หรือหน่วยบริการฉีดวัคซีนในสังกัดทราบ เพื่อเร่งรัดความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ (วัคซีน OPV และ IPV) ในกลุ่มเป้าหมาย ดังต่อไปนี้

๑. ขอให้ติดตามหน่วยบริการในพื้นที่ ดำเนินการติดตามเร่งรัดเพิ่มความครอบคลุมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ (วัคซีน OPV และ IPV) ในกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ทุกพื้นที่ (ตำบล/อำเภอ/จังหวัด) และพื้นที่ที่มีระดับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนต่ำ ขอให้ดำเนินการค้นหาเด็กที่ไม่เคยได้รับวัคซีน (Zero dose) พร้อมติดตามมารับวัคซีน

๒. ขอให้เจ้าหน้าที่สถานบริการตรวจสอบข้อมูลการรับวัคซีน และประสานติดตามเด็กกลุ่มเป้าหมายที่พลาดการรับวัคซีน เด็กที่ได้รับวัคซีนล่าช้า หรือไม่เคยได้รับวัคซีนให้มารับวัคซีนโดยเร็ว

๓. เน้นย้ำ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักถึงประโยชน์ และความสำคัญการรับวัคซีน แก่ผู้ปกครองในการพาบุตรหลานมารับวัคซีนให้ตรงตามกำหนด สามารถดาวน์โหลดสื่อความรู้ ได้ที่เว็บไซต์ กองโรคติดต่อทั่วไป ทางลิงก์ <https://ddc.moph.go.th/dcd/>

๔. กำกับ ติดตาม และเร่งรัดหน่วยบริการสาธารณสุข ดำเนินการบันทึกข้อมูลการรับบริการ
วัคซีนของเด็กกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ในฐานระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ Health Data Center
(HDC) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันตามช่วงเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรมควบคุมโรค โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๕๖ - ๗ และสามารถ
ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์ <https://shorturl.asia/fCnkh> หรือ QR Code ห้าหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริพันธ์ ศรีกรงพล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานป้องกันโรค

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวสุจิตรา ดาวเรือง โทร. ๐๘ ๑๑๗๔ ๓๗๓๘

นางสาวยุภาณี ช่วยเทศ



กำหนดการให้วัคซีน

ตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2568



อายุ	วัคซีนที่ให้	คำแนะนำ
แรกเกิด	HB1¹ (วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี)	ควรให้เร็วที่สุดภายใน 24 ชั่วโมงหลังคลอด
	BCG (วัคซีนป้องกันวัณโรค)	ฉีดให้เด็กก่อนออกจากโรงพยาบาล
1 เดือน	HB2 (วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี)	เฉพาะรายที่คลอดจากการคลอดที่เป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบี
2 เดือน	DTP-HB-Hib1 (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี-ฮิบ)	การให้วัคซีนให้ช้าครั้งแรก ควรให้ก่อนทารกอายุครบ 15 สัปดาห์
4 เดือน	IPV1² (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ครั้งที่ 1)	
	Rota1 (วัคซีนโรต้า)	
	DTP-HB-Hib2 (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี-ฮิบ)	การให้วัคซีนให้ช้าครั้งสุดท้าย ควรเสร็จสิ้นก่อนทารกอายุครบ 32 สัปดาห์ หากช้ากว่าที่กำหนดให้ดำเนินการตามคำแนะนำการให้วัคซีนล่าช้า
6 เดือน	IPV2 (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ครั้งที่ 2)	
	Rota2 (วัคซีนโรต้า)	
	DTP-HB-Hib3 (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี-ฮิบ)	- กรณีใช้วัคซีน Rotarix ให้เพียง 2 ครั้ง (ไม่ต้องให้ครั้งที่ 3) - การให้วัคซีนให้ช้าครั้งสุดท้าย ควรเสร็จสิ้นก่อนทารกอายุครบ 32 สัปดาห์ หากช้ากว่าที่กำหนดให้ดำเนินการตามคำแนะนำการให้วัคซีนล่าช้า
	OPV3³ (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ครั้งที่ 3)	
	Rota3 (วัคซีนโรต้า)	
9 เดือน	MMR1 (วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน)	
1 ปี	LAJE1 (วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์)	

อายุ	วัคซีนที่ให้	คำแนะนำ
1 ปี 6 เดือน	DTP4 (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน)	
	OPV4 (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ครั้งที่ 4)	
	MMR2 (วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน)	
2 ปี 6 เดือน	LAJE2 (วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์)	
4 ปี	DTP5 (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน)	
	OPV5 (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ครั้งที่ 5)	
	MMR (วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน)	
	HB (วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี)	
	LAJE (วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์)	
	IPV (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดติด)	
	dT (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก)	
	OPV (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน)	
ประถมศึกษาปีที่ 1	BCG (วัคซีนป้องกันวัณโรค)	- ให้ในกรณีที่ไม่ฉีดตั้งแต่อายุแรกเกิด - ไม่ให้เป็นแผลลึกหรือติดเชื้อ - ไม่มีอาการของโรคต่อส
ประถมศึกษาปีที่ 5 (หญิง)	HPV (วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อเอชพีวี)	- วัคซีน HPV 2 หรือ 4 ตามพื้นที่ ให้ฉีด 2 ครั้ง ระยะห่างระหว่างเข็ม ผ่านอย่างน้อย 6 เดือน หรือ - วัคซีน HPV 9 ตามพื้นที่ฉีด 1 ครั้ง
ประถมศึกษาปีที่ 6	dT (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก)	

กำหนดการให้วัคซีนแก่เด็กที่มารับวัคซีน



ไม่ครบถ้วนหรือล่าช้า

ครั้งที่	ช่วงอายุ 1-6 ปี		ตั้งแต่อายุ 7 ปีขึ้นไป		คำแนะนำ
	เดือนที่	วัคซีน	เดือนที่	วัคซีน	
1	0 (เมื่อแรกเกิด)	DTP-HB-Hib1 IPV1 MMR1 BCG	0 (เมื่อพบเด็กครั้งแรก)	dT1 IPV1 MMR1 BCG	- ให้ฉีดตามอายุ 2 ปี 6 เดือน OPV ตามพื้นที่ - การให้วัคซีนล่าช้าครั้งสุดท้าย ควรเสร็จสิ้นก่อนทารกอายุครบ 32 สัปดาห์ หากช้ากว่าที่กำหนดให้ดำเนินการตามคำแนะนำการให้วัคซีนล่าช้า
2	1	DTP-HB-Hib2 IPV2 LAJE1	1	HB1 IPV2 LAJE1	
3	2	MMR2 ⁴	2	dT2 MMR2 Hib2	กรณีให้วัคซีนล่าช้าครั้งสุดท้าย ควรเสร็จสิ้นก่อนทารกอายุครบ 32 สัปดาห์ หากช้ากว่าที่กำหนดให้ดำเนินการตามคำแนะนำการให้วัคซีนล่าช้า
4	4	DTP-HB-Hib3 OPV3	7	HB3	
5	10	DTP4 OPV4 LAJE2	10	dT3 OPV5 LAJE2	
6*	*กรณีเด็กอายุ 4 ปีขึ้นไป	DTP5 OPV5			หากได้รับวัคซีน DTP4 หรือ OPV4 เมื่ออายุ 4 ปีขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนโปลิโอครั้งที่ 5 (DTP5 หรือ OPV5)

หมายเหตุ

- กำหนดการให้วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2568 สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค
- วัคซีนทุกชนิด ควรให้ตามกำหนด ตามอายุให้วัคซีนตามกำหนด
- สำหรับวัคซีนที่มีชื่ออื่นว่า 1 คือ หากเด็กได้รับวัคซีนที่ชื่ออื่นว่า 1 สามารถให้วัคซีนที่ชื่ออื่นว่า 1 ได้
- กรณีวัคซีนที่ได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วนตามกำหนด ให้ดำเนินการตามกำหนดการให้วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2568
- หากได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DTP) 1-5 ครั้ง ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (dT) 1 ครั้ง
- หากได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DTP) 1-5 ครั้ง ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (dT) 1 ครั้ง
- หากได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DTP) 1-5 ครั้ง ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (dT) 1 ครั้ง
- หากได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DTP) 1-5 ครั้ง ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (dT) 1 ครั้ง
- หากได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DTP) 1-5 ครั้ง ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (dT) 1 ครั้ง
- หากได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DTP) 1-5 ครั้ง ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (dT) 1 ครั้ง

สามารถดาวน์โหลด

กำหนดการให้วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ของกระทรวงสาธารณสุข 2568 สามารถสืบค้นผ่านทาง
<https://ehorturi-dde.moph.go.th/PlanVO> หรือทาง QR Code



วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ

โรคโปลิโอ คืออะไร

โปลิโอ เกิดจากเชื้อไวรัสโปลิโอ ติดต่อจากการรับประทานอาหารหรือน้ำดื่มที่ปนเปื้อนเชื้อ เด็กที่เป็นโปลิโอจะมีแขนขาอ่อนแรงเฉียบพลัน และพิการตลอดชีวิต แม้ว่าประเทศไทยจะไม่มีโรคโปลิโอมานานแล้ว แต่ยังมีความเสี่ยงที่เชื้อจะกลับมาระบาดได้อีก



คุณสมบัติวัคซีน

- วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอประสิทธิภาพสูง มี 2 ชนิดคือ
- ชนิดรับประทาน มี 2 สายพันธุ์ ทำจากเชื้อมีชีวิตที่ทำให้อ่อนฤทธิ์
 - ชนิดฉีด มี 3 สายพันธุ์ ทำจากเชื้อตาย มีทั้งแบบ ฉีดแยกเข็ม และแบบรวมกับวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน



รับวัคซีนอย่างไร

วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด (IPV) จำนวน 2 เข็ม

วัคซีนโปลิโอชนิดรับประทาน (OPV) จำนวน 3 ครั้ง



ที่อายุ 2 เดือน

4 เดือน

ที่อายุ 6 เดือน

1 ปี 6 เดือน

4 ปี

ตั้งแต่ กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป จะใช้ สูตรการรับวัคซีนป้องกันโปลิโอ แบบ “2 ฉีด 3 หยอด” ตามช่วงอายุ ของเด็กดังภาพ ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในเด็กไทยมากขึ้น

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังรับวัคซีน

- ชนิดรับประทาน อาจเกิดภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง คล้ายโปลิโอ ได้ในอัตราน้อยกว่า 1 ในล้าน
- ชนิดฉีด อาจทำให้ บวม แดง เจ็บบริเวณที่ฉีด และอาจทำให้ มีไข้ ปวดศีรษะ เหนื่อยเพลีย ซึ่งอาจเป็นได้ 1-2 วันหลังฉีด

ข้อควรปฏิบัติ

- พักสังเกตอาการ 30 นาทีหลังฉีดวัคซีน ณ สถานที่รับบริการ และควรสังเกตอาการต่อที่บ้าน
- หากมีอาการข้างเคียงหลังจากได้รับวัคซีนควรแจ้งแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก่อนรับวัคซีน ครั้งต่อไป
- หากรับวัคซีนแล้วมีอาการแพ้รุนแรงควรรีบพบแพทย์ หรือโทร 1669
- ควรรับวัคซีนตามกำหนดและเก็บสมุดบันทึกการรับวัคซีนไว้ตลอดไป
- หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวัคซีนควรปรึกษาแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข